



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



Álgebra

Tema: Gráfica de funciones I

Docente: José Luis Vásquez Carhuamaca

academiacesarvallejo.edu.pe


GRÁFICA DE FUNCIONES

La gráfica de una función f es la representación de todos sus pares ordenados (x, y) de la función en el plano cartesiano.

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \in \text{Dom}f \wedge y = f(x)\}$$


Ejemplo

Grafique $f = \{(3; 2); (4; -1); (-3; -2); (-3; 1)\}$




Propiedad

Una gráfica corresponde a una función, si al trazarle rectas verticales, estas la intersecan a lo más en un solo punto.




La gráfica de f sí corresponde a una función.




La gráfica de R no corresponde a una función.

Observación

1)




2)



$$\text{Dom } f = [a; b]$$

$$\text{Ran } f = \langle c; d \rangle$$

3)



Corte con el eje Y

$$y_1 = f(0)$$

Corte con el eje X


$$f(x) = 0$$


su CS = $\{x_1; x_2; x_3\}$

Ejercicio

Grafique $f(x) = x^2 - 2x - 8$

Resolución






Corte entre f y g

$$f(x) = g(x)$$

$$\text{su CS} = \{x_1; x_2\}$$

Ejercicio

Halle los puntos de intersección (puntos en común A y B) entre las gráficas de f y g .



Resolución

FUNCIÓN CONSTANTE

Regla de correspondencia:


$$f(x) = k \quad k \text{ es una constante}$$

- $\text{Dom}f = \mathbb{R}$ (si no es dato)
- $\text{Ran}f = \{k\}$
- Su gráfica es una recta paralela al eje X


Ejemplos

- Grafique $f(x) = 2$


x	$f(x)$
0	2
1	2
2	2
-1	2
-2	2



- Grafique $f(x) = -2, \quad x \in [-2; 3)$



- Grafique $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 2 \\ -2, & x < 2 \end{cases}$



FUNCIÓN LINEAL

Regla de correspondencia:

$$f(x) = ax + b \quad a \neq 0$$

- $\text{Dom}f = \mathbb{R}$ (si no es dato)
- $\text{Ran}f = \mathbb{R}$
- Su gráfica es una recta no paralela a los ejes.
- Solo se necesita **dos puntos** para trazar una **recta**


Ejemplo

- Grafique $f(x) = -2x + 6$


Resolución:

Tabulando

x	$f(x)$




En general: Sea $f(x) = ax + b$; $a \neq 0$



- Grafique $f(x) = 2x - 4$


T.I. =

Raíz =



Ejercicio

Determine $f(x)$ cuya gráfica es la siguiente





Resolución:

Pendiente de la recta

Es la tangente del ángulo trigonométrico positivo formado por el eje X y la recta.

Sea $f(x) = mx + b$; $m \neq 0$



Pendiente = $\tan \theta$

→ $m = \tan \theta$

Observación :

Dos rectas son **perpendiculares**, si y solo si el **producto de sus pendientes es -1**

FUNCIÓN CUADRÁTICA

Regla de correspondencia:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad a \neq 0$$

- $\text{Dom}f = \mathbb{R}$ (si no es dato) • $\text{Ran}f \subset \mathbb{R}$
- Su gráfica es una parábola vertical.
- Para graficarlo es conveniente conocer las coordenadas de su vértice, para ello en $f(x)$ completamos cuadrados y se obtiene

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$


vértice: $V = \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a} \right) = \left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right) \right)$

equivalente $V = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}; f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \right)$


donde x_1 y x_2 son las raíces de $f(x)$

Grafiquemos considerando dos casos:

I) $a > 0$ Parábola cóncava hacia arriba




II) $a < 0$ Parábola cóncava hacia abajo



Ejercicio

Grafique $f(x) = x^2 - 4x - 5$

Resolución:

**Ejercicio**







Halle los rangos de las siguientes funciones:

$$f(x) = x^2 - 2x - 5, \quad g(x) = -x^2 + 3x - 1$$

Resolución:

Propiedades:

Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$; $a \neq 0$

$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Las raíces son reales diferentes	Las raíces son reales e iguales	Las raíces no son reales
		
		


Ejercicio

Según el gráfico de

$$f(x) = x^2 - 4x - m + 10$$


Halle la variación de m .

Resolución:



Observación

Si trazamos una recta vertical que pasa por el vértice, esta divide a la parábola en partes **simétricas**.




FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO

Regla de correspondencia:

$$f(x) = a|x - h| + k \quad a \neq 0$$

- $\text{Dom}f = \mathbb{R}$ (si no es dato)
- $\text{Ran}f \subset \mathbb{R}$
- Su gráfica tiene la forma de una uve cuyo vértice esta ubicada en $V = (h; k)$



Nota:

Si $a = \pm 1 \rightarrow \theta = 90^\circ$



Ejercicio

Grafique $f(x) = -3|x - 1| + 6$

Resolución:



GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe